

ROSA CAROLINA.

(CORYMBOSA).

R. (Carolina) Germinibus globosis pedunculisque sub-hispidis, petiolis pilosis subaculeatis, caule glabro, aculeis stipularibus subuncinatis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus corymbosis. WILLD. spec. 2, 1069. Pers. syn. 2, pag. 48.

R. Corymbosa. Ehrh. Betr. 4, pag. 21. Bosc, Nouv. Cours 11, p. 248. Non Poiret, Enc. vol. 4. 2° part. sup. p. 715.

LE ROSIER DE LA CAROLINE.

(Var. à fleurs en corymbe).

DESCRIPTION.

Ce Rosier n'est qu'une variété du R. Caroliniana de Michaux, et c'est à tort que Willdenow l'a présenté comme la véritable espèce (1).

Notre variété offre un arbrisseau de cinq à six pieds de haut, divisé en rameaux lisses, rougeâtres, munis, sur-tout à la base, de quelques aiguillons inégaux, épars, presque

(1) Le Rosier de Caroline diffère de la variété dont nous donnons la figure, 1° par sa tige qui ne s'élève qu'à un pied et demi, ou deux pieds; 2° par ses feuilles aiguës coriacées, comme luisantes en-dessus, de la longueur de douze à quinze lignes au plus; 3° et enfin par ses fleurs solitaires ou géminées. Roessig a donné une assez bonne figure de ce Rosier, nº 44. Il fait aussi partie de la collection d'Andrews.

Le Rosier de Pensylvanie se rapproche de notre variété par ses fleurs en corymbe, mais il s'en éloigne par ses ovaires constamment glabres, et ses pétioles non épineux, seu-lement mules au toucher.

lement rudes au toucher.

En général on doit dire qu'il existe de très-grands rapports entre le Rosier Canelle (Cinnamomea), le Rosier de Mai (Maialis), le Rosier de Caroline (Carolina), le Rosier de Pensylvanie (Pensylvanica), et le Rosier à fleurs en corymbe (Corymbosa). Peut-être serait-il possible de réunir ces espèces, qui paraissent sortir de la même souche, pour n'en former qu'un seul groupe.

